

AXIAL 50 EC®

Concentrato emulsionabile
Diserbante selettivo per orzo, frumento tenero, frumento duro, segale, triticale e farro (spelta)
Pinoxaden - Codice HRAC-WSSA 1;A

Composizione
100 g di prodotto contengono:
pinoxaden puro g 5,05 (50 g/l)
cloquintocet-mexyl puro (antidoto) g 1,26 (12,5 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene pinoxaden, cloquintocet-mexyl e 2-methylpentane-2,4-diol

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H332 Nocivo se inalato

H361d Sospettato di nuocere al feto

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280: Indossare guanti e indumenti protettivi.
P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico
P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente

SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Registrazione Ministero della Salute n. 18404 del 26.01.2024
Stabilimenti di produzione:
CHEMARK ZRT - Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)
Syngenta Chemicals B.V, Seneffe (Belgio)
TORRE S.r.l., Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
Stabilimenti di rietchettatura:
ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)
Arco Logistica S.r.l., Via Monari, 5 Ferrara (FE)
Sinteco Logistics S.p.A. - San Giuliano Milanese (MI)
Taglie: ml 750; litri 1-3-3,75-4-4,8-5-7,5-8-10-16-20

Partita n. vedi corpo della confezione

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata oppure utilizzando attrezzature che riducano la deriva almeno del 50%.

Si consiglia l'utilizzo di tuta e guanti durante il miscelamento del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

Caratteristiche

AXIAL 50 EC è un diserbante graminicida selettivo per orzo, frumento tenero, frumento duro, segale, triticale e farro (spelta) da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante. La formulazione del prodotto garantisce un rapido assorbimento del principio attivo e assicura un effetto rapido e sicuro. Poiché AXIAL 50 EC è efficace solo per assorbimento fogliare, l'effetto è indipendente dal tipo di terreno o dall'umidità del suolo.

AXIAL 50 EC è un formulato pronto per l'impiego e non richiede l'aggiunta di coadiuvanti o bagnanti.

Spettro d'azione

Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Avena selvatica (*Avena fatua*), Avena (*Avena spp.*) Loglio (*Lolium spp.*), Falaride (*Phalaris spp.*), Poa (*Poa trivialis*), Agrostide annuale (*Apera spica-venti*).

I risultati migliori si ottengono applicando AXIAL 50 EC su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego

Epoca di applicazione:

Post-emergenza con cultura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di fine levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata. Le graminacee infestanti devono essere completamente germogliate, in quanto AXIAL 50 EC agisce solo per assorbimento fogliare.
Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 200 e 400 litri per ettaro.

Dosi: 0,9 – 1,2 l/ha

Utilizzare il dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in presenza di Loglio (*Lolium spp.*) e Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*).

Non utilizzare il prodotto per trattamenti autunnali.

Avvertenze agronomiche

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCasi. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione culturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la cisterna per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della cisterna con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nella cisterna più del tempo necessario per la distribuzione.

Immediatamente dopo l'uso, pulire accuratamente l'attrezzatura di applicazione. Svuotare completamente il sistema e sciacquare il serbatoio, le condutture e gli ugelli due o tre volte con acqua pulita fino a quando tutte le tracce di prodotto sono state rimosse.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

Per una corretta difesa erbicida, si raccomanda sempre di seguire le linee guida HRAC specifiche per colture e infestanti.

Compatibilità

AXIAL 50 EC non è miscelabile con dicotiledonici contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

AVVERTENZE:

Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Effettuare prove di compatibilità prima della miscelazione con altri prodotti.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 gennaio 2024 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29.08.2026

