

Registrazione n 16600 del 07/08/25 del Ministero della Salute
Contenuto netto: 50-100-150-200-250-300-500-750 ml; 1-1,5-2-2,5-3-5 litri
Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
SPe3: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su agrumi e olivo.

applicazioni su agrumi e olivo.

SPe3: Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata da zona non coltivata di:

- 15 m in combinazione con ugelli che riducono la deriva del 90% oppure 20 m in combinazione con ugelli che riducono la deriva del 75% per applicazioni su agrumi (250-500 ml/ha) e olivo;
- 15 m in combinazione con ugelli che riducono la deriva del 90% per

SPe8: per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non usare quando le api sono in attività per l'uso su agrumi (contro afidi, tripidi, mosca della frutta e aleirodidi) e su olivo. Per tutti gli usi non applicare durante il periodo di fioritura delle infestanti in campo.

- una sola applicazione per stagione ogni 3 anni su vite da vino e agrumi;
- due applicazioni per stagione ogni 3 anni su olivo.

[illegible]

Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

essere effettuata in caso di coltura densa, cioè quando gli operatori non possono evitare il contatto con la coltura trattata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Informazioni di pronto soccorso

- In caso di inalazione: portare all'aria aperta e consultare immediatamente il medico.

- In caso di prolungato contatto con la pelle: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e consultare un medico.

- In caso di contatto con gli occhi: risciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua, anche sotto le palpebre. Se necessario, consultare immediatamente un medico.

- In caso di ingestione: se la persona è cosciente, risciacquare la bocca e consultare un medico.

Non provocare il vomito senza il parere di un medico. Non somministrare nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). **Terapia:** sintomatica.

intervenendo in fase di ovideposizione o alla schiusura delle prime uova.

- Per il controllo di *Phyllocnistis citrella* (BBCH 31-50) utilizzare **40 ml/hl** (400-740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 300-1850 L/ha, intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve, prima che siano visibili le mine sulle foglie.
- Per il controllo di *Aphis gossypii* e *Aphis spiraeicola* (BBCH 09-39) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Pezothrips kellyanus* (BBCH 51-71) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Ceratitis capitata* (BBCH 74-82) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Aleurothrix floccosus*, *Dialeurodes citri* e *Aleurocanthus spiniferus* (BBCH 51-72) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-2000 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.

Olio: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra la comparsa degli abbozzi floreali e l'inviatura (BBCH 50-81). Per il controllo di *Prays oleae*, *Philaenus spumarius*, *Palpita unionalis*, *Euphyllura olivina*, *Euzophera pinguis* e *Dasineura oleae* utilizzare **20 ml/hl** (200-350 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 700-1750 L/ha. Intervenire alla comparsa del parassita per *P. spumarius* ed *E. olivina* e in fase di ovideposizione o alla schiusura delle prime uova per gli altri parassiti.

Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione ogni 3 anni.
Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7 giorni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

EXIREL® è un prodotto a base di cyantraniliprole ed appartiene al Gruppo 28 (RRM = modulatore dei recettori nanodinici) secondo la classificazione IRAC (Insecticides Resistance Action Committee). Per tutte le colture applicare i prodotti appartenenti al Gruppo 28 evitando di trattare generazioni consecutive dei parassiti bersaglio (approccio per "finestra d'impiego"). Tra due finestre d'impiego consecutive, alternare i trattamenti (singoli o a blocchi) con altri prodotti efficaci appartenenti a gruppi IRAC diversi, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomici e biologici. Non effettuare più di due applicazioni di insetticidi appartenenti al Gruppo 28 per generazione del parassita/finestra d'impiego. Per colture a ciclo breve (minore di 50 giorni), s'intende come finestra d'impiego la durata del ciclo della coltura. Per una corretta difesa insetticida si raccomanda di seguire sempre le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente. Una volta effettuato il trattamento ed il prodotto si è completamente asciugato sulla vegetazione, eventuali precipitazioni che dovessero verificarsi già dopo 2 ore dall'applicazione non pregiudicano l'efficacia della stessa.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempiere il serbatoio dell'irroratrice da un quarto a metà del volume totale con acqua pulita, quindi agitare la confezione del prodotto ed aggiungere EXIREL® alla dose stabilita.

Mettere in funzione l'agitatore dell'irroratrice e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste.

In caso di miscele si consiglia di introdurre EXIREL® rispettando la seguente sequenza di miscelazione: (1) sacchetti idrosolubili (WSB); (2) granuli idrosolubili (WG); (3) granuli idrodispersibili (WG, XP, DF); (4) polveri bagnabili (WP); (5) concentrati in sospensione acquosa (SC); (6) concentrati idrosolubili (SL); (7) EXIREL® ed altre suspo-emulsioni (SE); (8) concentrati in sospensione oleosa (OD); (9) concentrati emulsionabili (EC); (10) coadiuvanti, bagnanti, olii. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio. Se il pH della miscela insetticida contenente EXIREL® è uguale o superiore a 8, si raccomanda di distribuire la miscela entro 4 ore dalla preparazione o acidificare la soluzione ad un pH compreso tra 7 e 5.

COMPATIBILITÀ

EXIREL® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non conservare a temperatura inferiore a 0°C.

FITOTOSSICITÀ

EXIREL® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Agrumi: 7 giorni

Vite da vino: 10 giorni

Olio: 14 giorni

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Exirel è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 febbraio 2026