

- Per il controllo di *L. bofrana* utilizzare 50-60 ml/hl (**340 ml/ha**) in un volume d'acqua di 570-680 L/ha localizzati nella zona dei grappoli. Intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova.
- Per il controllo di *Empoasca vitis*, *Jacobiasca lybica*, *Planococcus ficus*, *Philaenus spumarius*, *Phyllocnistis vitegenella*, *Antispila* spp. e *Anomala vitis* utilizzare 50-60 ml/hl (340 ml/ha) in un volume d'acqua di 570-680 L/ha. Su cicaline, sputacchina e *Anomala vitis* intervenire alla comparsa del parassita. Su cocciniglie intervenire all'inizio della migrazione delle neanidi. Su fillominatori intervenire in fase di ovideposizione prima della schiusura uova.

Agrumi: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra l'accrescimento dei germogli e la maturazione. **È consentita 1 sola applicazione per stagione ogni 3 anni.**

- Per il controllo di *Prays citri* (BBCH 31-50) utilizzare **25 ml/hl** (250-500 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 300-2000 L/ha, intervenendo in fase di ovideposizione o alla schiusura delle prime uova.
- Per il controllo di *Phyllocnistis citrella* (BBCH 31-50) utilizzare **40 ml/hl** (400-740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 300-1850 L/ha, intervenendo in fase di ovideposizione o alla comparsa delle primissime larve, prima che siano visibili le mine sulle foglie.
- Per il controllo di *Aphis gossypii* e *Aphis spiraeola* (BBCH 09-39) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Pezothrips kellyanus* (BBCH 51-71) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Ceratitis capitata* (BBCH 74-82) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-990 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.
- Per il controllo di *Aleurothrixus floccosus*, *Dialeurodes citri* e *Aleurocanthus spiniferus* (BBCH 51-72) utilizzare **75 ml/hl** (740 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 740-2000 L/ha, intervenendo alla prima presenza dei parassiti.

Olivio: può essere impiegato nelle fasi fenologiche comprese fra la comparsa degli abbozzi florali e l'involatura (BBCH 50-81). Per il controllo di *Prays oleae*, *Philaenus spumarius*, *Palpita unionalis*, *Euphyllura olivina*, *Euzophera pinguis* e *Dasineura oleae* utilizzare **20 ml/hl** (200-350 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 700-1750 L/ha. Intervenire alla comparsa del parassita per *P. spumarius* ed *E. olivina* e in fase di ovideposizione o alla schiusura delle prime uova per gli altri parassiti.

Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione ogni 3 anni. Rispettare un intervallo tra i trattamenti di 7 giorni.

Ciliegio: per il controllo di *Drosophila suzukii* utilizzare **75 ml/hl** (750 ml/ha) di prodotto in un volume d'acqua di 1000 L/ha, intervenendo alla comparsa degli adulti durante le fasi fenologiche di suscettibilità del frutto agli attacchi del parassita, comprese fra l'involatura e la maturazione (BBCH 79-87).

È consentita 1 sola applicazione per stagione ogni 3 anni.

Non applicare su suoli con pH inferiore a 6.

Barbabetola da zucchero e da seme: per il controllo di *Spodoptera* spp. utilizzare 500 ml/ha di prodotto in un volume d'acqua di 200-400 L/ha, intervenendo in fase di ovideposizione o alla schiusura delle prime uova, nelle fasi fenologiche comprese fra l'inizio dello sviluppo della

radice e il raggiungimento della dimensione adatta alla raccolta (BBCH 40-49).

È consentita 1 sola applicazione per stagione.

Non applicare su suoli con pH inferiore a 6.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA

EXIREL® è un prodotto a base di ciantraniliprole ed appartiene al Gruppo 28 (RRM = modulatore dei recettori rianodinici) secondo la classificazione IRAC (Insecticides Resistance Action Committee). Per tutte le colture applicare i prodotti appartenenti al Gruppo 28 evitando di trattare generazioni consecutive dei parassiti bersaglio (approccio per "finestra d'impiego"). Tra due finestre d'impiego consecutive, alternare i trattamenti (singoli o a blocchi) con altri prodotti efficaci appartenenti a gruppi IRAC diversi, unitamente all'impiego di mezzi di controllo agronomici e biologici. Non effettuare più di due applicazioni di insetticidi appartenenti al Gruppo 28 per generazione del parassita/finestra d'impiego. Per colture a ciclo breve (minore di 50 giorni), s'intende come finestra d'impiego la durata del ciclo della coltura. Per una corretta difesa insetticida si raccomanda di seguire sempre le linee guida IRAC specifiche per colture e parassiti.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Si consiglia di non effettuare il trattamento in caso di pioggia imminente. Una volta effettuato il trattamento ed il prodotto si è completamente asciugato sulla vegetazione, eventuali precipitazioni che dovessero verificarsi già dopo 2 ore dall'applicazione non pregiudicano l'efficacia della stessa.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice da un quarto a metà del volume totale con acqua pulita, quindi agitare la confezione del prodotto ed aggiungere EXIREL® alla dose stabilita.

Mettere in funzione l'agitatore dell'irroratrice e portare a volume mantenendolo in funzione anche durante eventuali soste.

In caso di miscele si consiglia di introdurre EXIREL® rispettando la seguente sequenza di miscelazione: (1) sacchetti idrosolubili (WSB); (2) granuli idrosolubili (SG); (3) granuli idrodispersibili (WG, XP, DF); (4) polveri bagnabili (WP); (5) concentrati in sospensione acquosa (SC); (6) concentrati idrosolubili (SL); (7) EXIREL® ed altre suspo-emulsioni (SE); (8) concentrati in sospensione oleosa (OD); (9) concentrati emulsionabili (EC); (10) coadiuvanti, bagnanti, olii. Il contenitore deve essere completamente svuotato e risciacquato con acqua pulita; il liquido di risciacquo deve essere versato direttamente nel serbatoio.

Se il pH della miscela insetticida contenente EXIREL® è uguale o superiore a 8, si raccomanda di distribuire la miscela entro 4 ore dalla preparazione o acidificare la soluzione ad un pH compreso tra 7 e 5.

COMPATIBILITÀ

EXIREL® non è compatibile con i preparati aventi reazione alcalina.

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non conservare a temperatura inferiore a 0°C.

FITOTOSSICITÀ

EXIREL® è selettivo per le colture riportate in etichetta. In caso di miscela con altri formulati e/o introduzione di nuove varietà si consiglia di effettuare dei saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Agrumi e ciliegio: 7 giorni

Vite da vino: 10 giorni

Olivio e barbabietola da zucchero: 14 giorni

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Exirel è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 31 marzo 2026, valida da 31.03.2026 a 28.07.2026