

FOLPAN® GOLD

Granuli idrodispersibili

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite

FOLPAN GOLD

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12878 del 03.01.2006

Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro

folpet puro

coformulanti q.b. a

g 4,85

g 40

g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare. H332 - Nocivo se inalato. H351 - Sospettato di provocare il cancro. H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 -Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352– IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340– IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338 -IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P314 - In caso di malessere, consultare un medico.
P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501–Smettere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione

ADAMA ITALIA S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG). Tel. 035 328811

Dosi e modalità d'impiego

Il primo trattamento è da eseguire dopo il verificarsi della prima

Coltura	Patogeno	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (<i>Plasmopara Viticola</i>)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permette anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:

- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

L'uso regolare del FOLPAN GOLD per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.

Avvertenze:

Qualora si verificasse una ridotta o mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Non impiegare il prodotto in vivai di vite.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api e nociva per gli uccelli.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Stabilimenti di produzione:
Syngenta Production France SAS - Gaillon (Francia)
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Götzau (Germania)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Stabilimenti di confezionamento :
CHEMARK Zrt. – 8182 Peremarton – Ungheria,
KOLLANT S.r.l – Maniago (PN), SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO),
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)

Contenuto : kg 1- 5 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 4,85%
folpet 40%
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

FOLPAN GOLD è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER
L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.**

**DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**