

METRO

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

METRO

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

METRIBUZIN puro	g	35
Coformulanti	q.b. a	g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 12522 del 06/12/2005

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE:

ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B-4102 Ougrée (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); SULPHUR MILLS, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India); Exwold Technology Limited, Brenda Rd, Hartlepool TS25 2BW (Regno Unito)

Stabilimenti di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; ARCO Logistica Srl – Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassiriya 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)

Distributori: Agrisystem srl - Via dei Bizantini 216, 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel.: 0968461121; NUFARM ITALIA SRL - Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO, Gowan Italia S.r.l. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911; CHEMIA - Via Statale, 327 - 44040 Dosso (FE) ; SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD, rappresentata da SHARDA EUROPE B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgio). Tel +32(0)2 466.44.44; UPL Italia SRL – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523.

CONTENUTO: 0.1 - 0.2 - 0.25 - 0.5 - 1 Kg; 0.5Kg (2 Sacchetti idrosolubili da 0.25 Kg) - 0.5 Kg (5 Sacchetti idrosolubili da 0.1 Kg) - 0.6 Kg (3 Sacchetti idrosolubili da 0.2 Kg) - 1 Kg (5 Sacchetti idrosolubili da 0.2 Kg) - 1 Kg (4 Sacchetti idrosolubili da 0.25 Kg) - 1 Kg (2 Sacchetti idrosolubili da 0.5 Kg)

Partita n.:



ATTENZIONE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoa allergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE - METRO è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*Setaria viridis*), Amaranto (*Amarantus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Stramonio (*Datura stramonium*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanella (*Raphanus raphanistrum*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*).

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO - METRO può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

PATATA: a) trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,8 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato. b) Trattamenti di post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha. METRO si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

POMODORO: a) trattamenti di pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare. b) Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,5 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura).

SOIA: trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (Metolacior, ecc.).

ASPARAGO: trattamenti prima dell'emergenza dei turioni: 1,0-1,2 Kg/ha intervenendo su asparagie di almeno due anni di impianto.

ERBA MEDICA: 1,0 - 1,5 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.

Avvertenze: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno.

COMPATIBILITA' - METRO può essere miscelato con altri erbicidi a reazione neutra.

AVVERTENZE D'USO - Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - METRO non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. METRO non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbono effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. METRO può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, 60 giorni per Patata, Soia, Asparago ed Erba medica.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

METRO**ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI****METRO****COMPOSIZIONE** - 100 grammi di prodotto contengono:

METRIBUZIN puro g 35

Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**ATTENZIONE****PRODOTTO FITOSANITARIO**

Registrazione del Ministero della Salute n. 12522 del 06/12/2005

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11**Stabilimenti di produzione:** Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL, rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); SULPHUR MILLS, 1904-1905 G.I.D.C. Panoli, Dist. Bharuch, Gujarat (India); Exwold Technology Limited, Brenda Rd, Hartlepool TS25 2BW (Regno Unito)**Stabilimenti di rietchettatura:** ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; ARCO Logistica Srl – Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassiriya 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)**Distributori:** Agrisystem srl - Via dei Bizantini 216, 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel.: 0968461121; NUFARM ITALIA SRL - Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO, Gowan Italia S.r.l. - Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911; CHEMIA - Via Statale, 327 - 44040 Dosso (FE); SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT LTD, rappresentata da SHARDA EUROPE B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgium), tel +32(0)2 466.44.44; UPL Italia SRL – Via Temi, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523**CONTENUTO:** g 500 (5 x g 100; 2 x g 250) - g 600 (3 x g 200) - Kg 1 (5 x g 200; 4 x g 250; 2 x g 500)

Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo:** dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE - METRO è un erbicida selettivo che agisce per assorbimento radicale e fogliare nei confronti di numerose erbe infestanti quali: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollio (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Setaria (*Setaria viridis*), Amaranto (*Amarantus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Stramonio (*Datura stramonio*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Euforbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Canapetta (*Galeopsis spp.*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanello (*Raphanus raphanistrum*), Erba calderina (*Senecio vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino (*Sonchus oleraceus*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba stoma (*Thlaspi arvense*).

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO - METRO può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

PATATA: **a)** trattamenti di pre-emergenza: 0,5-0,8 Kg/ha, impiegando la dose più elevata nei terreni di medio impasto o tendenti all'argilloso. Nei terreni argillosi o particolarmente ricchi di sostanza organica elevare il dosaggio a 1 Kg/ha di formulato. **b)** Trattamenti di post-emergenza: 0,5-0,6 Kg/ha. METRO si è dimostrato perfettamente tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkmaria, Apollo, Bea, Bintje, Desirée, Favorita, Hulmada, Kardinal, Kennebec, Majestic, Primura, Resy, Rosanna, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.

POMODORO: **a)** trattamenti di pre-semina e pre-trapianto: 0,5-0,6 Kg/ha, intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato senza interrare. **b)** Trattamenti di post-emergenza o post-trapianto: 0,3-0,5 Kg/ha, utilizzando la dose più alta nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica ed intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (generalmente corrispondente alla fase di pre-fioritura).

SOIA: trattamenti di pre-semina o di pre-emergenza: 0,5-0,7 Kg/ha in miscela con formulati a prevalente attività graminicida (Metolacolor, ecc.). **ASPARAGO:** trattamenti prima dell'emergenza dei turioni: 1,0-1,2 Kg/ha intervenendo su asparagiale di almeno due anni di impianto.

ERBA MEDICA: 1,0 - 1,5 Kg/ha applicando il dosaggio più elevato nei terreni più argillosi ed intervenendo quando la coltura, a seguito degli abbassamenti termici, è entrata in pieno riposo vegetativo.

Avvertenze: eseguire i trattamenti in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta la superficie da trattare, evitando sovrapposizioni o contaminazioni di colture adiacenti. Dopo l'applicazione, non effettuare alcuna lavorazione al terreno.

COMPATIBILITA' - METRO può essere miscelato con altri erbicidi a reazione neutra.

AVVERTENZE D'USO - Nel caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti solubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.


FITOTOSSICITA' - METRO non deve essere impiegato nel diserbo del pomodoro in serra o sotto tunnel. METRO non deve inoltre essere utilizzato nel diserbo del pomodoro qualora: - venga impiegato un quantitativo di seme inferiore ai 2,5 Kg/ha e su terreni che diano origine a crosta; - la coltura presenti sintomi di sofferenza (per siccità, alte temperature, ecc.); - si debbono effettuare lavorazioni del terreno o irrigazioni entro 6-7 giorni dall'intervento erbicida. Il prodotto non deve essere applicato su Patate appartenenti alle cultivar Draga, Jurla e Vivax in quanto sensibili all'erbicida. METRO può dare origine a fenomeni di fitotossicità su colture di Soia in terreni particolarmente sabbiosi.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni per il Pomodoro, 60 giorni per Patata, Soia, Asparago ed Erba medica.


Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL

SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. - DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE - DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE




1) Riempire l'atomizzatore col 25% di acqua




2) Prelevare il numero di sacchetti idrosolubili chiusi previsti



3) Introdurre i sacchetti nell'atomizzatore e mettere in funzione l'agitatore



4) Attendere qualche minuto lo scioglimento dei sacchetti ed...



5) ... aggiungere la restante parte d'acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione.

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

METRO

ERBICIDA SELETTIVO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI
IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

METRO

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

METRIBUZIN puro	g	35
Coformulanti q.b. a	g	100

Da sciogliere in acqua senza rompere

Avvertenza: leggere l'etichetta riportata sulla confezione

Registrazione del Ministero della Salute n. 12522 del 6/12/2005

**ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/2 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO) tel.: +32 4
385 97 11**



ATTENZIONE

CONTENUTO: g 100-200-250-500