

PIRANA

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DI OIDIO SU VIT CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC) - FRAC CODE 11

PIRANA - Registrazione del Ministero della Salute N. 17553 del 30/11/2023

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
PYRACLOSTROBIN puro g 23,6 (= 250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H332 Nocivo se inalato. H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P264 Lavare accuratamente le parti del corpo contaminate dopo l'uso. P261 Evitare di respirare la nebbia. P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO

CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare

l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che

favorisca la respirazione. P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE:

contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE): lavare con

acqua abbondante e sapone. P391 Raccogliere il materiale

fuoriuscito. P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare

un medico. P331 NON provocare il vomito. P361+P364 Togliere

immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli prima di

indossarli nuovamente. P310 Contattare immediatamente un

CENTRO ANTIVELENI o un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli

occhi persiste: consultare un medico. P403 Conservare in luogo

ben ventilato. P404 Conservare in un recipiente chiuso. P405

Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in

punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per

evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le

istruzioni per l'uso.

Titolare dell'autorizzazione:

Sharda Cropchem España S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 12th Floor
30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

Distribuito da:

CORTEVA AGRISCIENCE Italia S.r.l., Via dei Comizi Agrari 10,
26100 Cremona, Italia - Tel. 0372 709900

Stabilimenti di produzione:

Spachem S.L. - Pol. Ind. Guadasequies, s/n

46839 Guadasequies (Valencia), Spagna

Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd.,

3rd floor, No.45 Xiangyun Road, 225000

Yangzhou City, Jiangsu Province, Cina

NITROFARM SA, Industrial area Sindos, S.Q.20

BUILD.35, 57022, Thessaloniki, Grecia

Stabilimento di rietichettatura:

Arco logistica S.r.l., Via Monari 5, 44124 Ferrara (FE) e
Via Battistella 22, 44124 Ferrara (FE), Italia

Contenuto: 1-3-5-10 L

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro AntiveleNI.



PERICOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIRANA è un fungicida di copertura, con attività preventiva. Il suo principio attivo PYRACLOSTROBIN appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il meccanismo di azione.

PIRANA blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.

Grazie all'ampio spettro di azione, PIRANA possiede un'eccellente efficacia contro l'Oidio della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero Massimo di trattamenti
Vite	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha, ed equivale quindi a 400 g di prodotto per ettaro. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose più alta (40 ml/hl) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12 giorni).

Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente consecutivi.

Si consiglia di usare PIRANA soprattutto nel periodo critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già essere eseguito con PIRANA.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto alle dosi raccomandate si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 48 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E
BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI
VENTO DA NON VENDERSI
SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE
SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**